


## КОНСУЛЬТАТИВНАЯ СТРАНИЦА



Наиболее частым речевым нарушением у детей с ДЦП является дизартрия.

**Дизартрия** - это нарушение звукопроизводительной и просодической сторон речи, обусловленное недостаточной иннервацией органов речевого аппарата.

Проявляется дизартрия следующими нарушениями:

### **- Артикуляционные нарушения.**

Характеризуются нарушением мышечного тонуса органов артикуляции по типу спастичности, гипотонии, дистонии, что приводит к ограничению подвижности артикуляционной мускулатуры, а следовательно и к нарушениям звукопроизношения. (как гласных так и согласных, в отличие от дислалии).

### **- Дыхательные расстройства.**

Вследствие нарушения иннервации дыхательных мышц.

В норме имеется регуляция дыхания смысловым содержанием речи. При дизартрии данная регуляция или значительно нарушена, или отсутствует совсем.

Вдох поверхностный, выдох слабый, дыхание чаще ключичное.

Наблюдается дискоординация дыхания, фонации и артикуляции.

### **- Расстройства голосообразования.**

Голос чаще тихий, затухающий. Невозможны голосовые модуляции, иногда меняется тембр голоса.

### **- Просодические нарушения.**

Это интонационная невыразительность речи, аритмичность, отсутствие плавности.

Данные нарушения обусловлены видом дизартрии и выраженностью нарушений голосообразования, дыхания, артикуляции.

К неречевым проявлениям дизартрии относятся нарушения двигательного аппарата и мелкой моторики, эмоционально-волевые нарушения (повышенная возбудимость, утомляемость, нарушения познавательной сферы).

